

En el 2001, una directiva del Parlamento y Consejo Europeo sobre el uso de advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos se convirtió en ley. Como mínimo, las advertencias de texto deben aparecer en los paquetes de cigarrillos; el uso de etiquetas ilustrativas es opcional. La Comisión Europea (CE) ha elaborado etiquetas con advertencias ilustrativas y de texto que los estados miembro pueden optar por usar.

Fecha de implementación y rondas adicionales 2004

Cobertura del paquete

Los estados miembro de la UE deben mostrar advertencias de texto respecto a los siguientes criterios estándar:

REQUISITO MÍNIMO

	sin los bordes			con los bordes		
	total	frente	dorso	total	frente	dorso
Países monolingües	35%	30%	40%	48%	43%	53%
Países bilingües	39%	32%	45%	52%	45%	58%
Países plurilingües	43%	35%	50%	56%	48%	63%

Cronograma de rotación e historia

Hay una serie opcional de 42 advertencias ilustrativas. No se especifica la frecuencia recomendada de rotación.

Restricciones sobre la información engañosa


Se prohíbe que los descriptores engañosos tal como “ligero” y “suave” figuren en los paquetes.

Notas especiales

Muchos estados miembros que no pertenecen a la Unión Europea también han adoptado las imágenes de etiquetas con advertencias de la UE para utilizar en sus propios paquetes.

ADVERTENCIAS

2004



ADVERTENCIAS

2004



Smoking can damage the sperm and decrease fertility



Smoking can damage the sperm and decrease fertility



Smoke contains benzene, nitrosamines, formaldehyde and hydrogen cyanide

The risk of having a stroke is approximately 50% higher in smokers than in non-smokers

Smoking clogs the arteries and causes heart attacks and strokes



Smoking when pregnant harms your baby



Smokers die younger



Smoking can cause a slow and painful death



Get help to stop smoking: 0803 00 00 00



Smoking causes fatal lung cancer



Smoking causes fatal lung cancer



Smoking causes fatal lung cancer

Stopping smoking reduces the risk of fatal heart and lung diseases




Smoking may reduce the blood flow and causes impotence



Smoking may reduce the blood flow and causes impotence



Smoking may reduce the blood flow and causes impotence



Smoking when pregnant harms your baby

You can do it, we can help

Your doctor or your pharmacist can help you stop smoking



Smoking causes ageing of the skin



Stopping smoking reduces the risk of fatal heart and lung diseases



Smoking causes ageing of the skin

Lifetime smokers lose an average of 14 years of life

Smokers die younger



Smokers die younger

0803 00 00 00

Choose freedom, we'll help you

Get help to stop smoking

Smoking is a serious nicotine addiction, don't be afraid to ask for help

Your doctor or your pharmacist can help you stop smoking

ADVERTENCIAS

2004

